

市民公開講座アンケートより 質疑応答集②

Q. リアルダの効果はどのくらい出てきますか？今まで白血球除去無効。レミケード治療中ですが、悪化してきて2週間程前からリアルダが追加になりましたが、あまり改善はしていないようです。

A. リアルダは通常1~2週間くらいで効果が出てくると思われます。2週間経って効果がないのであれば、レミケード治療の変更を考慮された方が良いでしょう。

Q. 癌検診について。息子がクローン病を発症して8年が経ちます。(31歳) 痔ろう癌をはじめ、消化器の癌が心配です。現在、大腸内視鏡のみ年1回していただいているのですが、その他の検査は必要ないですか。あるとすれば、どのような検査をすればよいですか。(現在、レミケードとイムランを併用しています。回腸付近の狭窄があると聞いています。)

A. 大腸については大腸内視鏡、痔ろう癌については外科専門医への相談とMRIが重要です。回腸付近の狭窄は大腸内視鏡の際に一緒に診ていただくのが良いでしょう。小腸癌の頻度は少ないのですが担当の先生とも相談し、小腸内視鏡も考慮してください。

Q. 特保などの難消化性デキストリンは腸に負担がかかるのは何となく理解できるのですが、菓子などのパッケージに書かれている成分表にデキストリンの表記がある場合、買うのはやめた方が良いでしょうか？

A. 『デキストリン』はデンプンの一種で、その中の難消化性部分だけを抽出したものが『難消化性デキストリン』です。したがって、原材料名に『デキストリン』が記載されていても、購入して問題ないと思います。